



En el control de ratas y ratones, EL CEBO ES LA CLAVE

¿Sabía que...?



- La **rata común** excava madrigueras en el exterior, la **rata negra** prefiere lugares altos, graneros, altillos, falsos techos e incluso en los árboles y que los **ratones** viven dentro de los edificios, en huecos y rincones.
- Frente a la **rata común**, mejor **pocos puntos** de cebo pero con gran cantidad, mientras que frente al **ratón** hay que poner **muchos puntos** de cebo con pocos gramos de producto.
- La **rata negra** prefiere vivir en lugares elevados por lo que los cebos deben colocarse en **lugares altos**.
- La **rata común** hace las madrigueras fuera, por lo que resulta más adecuado poner **cebos en el exterior** para evitar que entren en las instalaciones.
- Las **presentaciones en pasta fresca y en bloques** son adecuados para el control de ratas, en cambio los ratones prefieren la pasta fresca.



Bayer HealthCare
Animal Health

ByeRat

Y diga adiós a
ratas y ratones



Bayer HealthCare
Animal Health

Soluciones líderes en Bioseguridad

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER S.L.
División Animal Health
Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. **93 495 65 00**

www.bayervet.net

Global/3000/QF906561

ByeRat. Composición por g: Brodifacoum 0,05 mg, sustancia amargante 0,01 mg. **Propiedades:** Es un anticoagulante de segunda generación derivado de la cumarina. **Indicaciones:** Rodenticida de dosis única para el control de ratas y ratones. **Modo de empleo:** Colocar 40 g por punto de cebo a intervalos de 5-10 metros para el control de ratas y 10 g cada 2-3 metros para el control de ratones. **Precauciones especiales:** Manipular el producto con guantes. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Procurar siempre que los cebos estén en perfectas condiciones, reemplazándolos cuando estén esparcidos o mezclados con la suciedad. **Registro:** Autorizado para uso ganadero, ByeRat Bloque nº 1181-P, ByRat Pasta nº 1182-P. **Presentación:** ByeRat Pasta: bolsa 250 g (25 bolsitas de 10 g); ByeRat Bloque: bolsa 250 g (25 bloques de 10 g)



LA MEJOR COMBINACIÓN

Economía de uso. Gracias al brodifacoum, el ingrediente activo con mayor efecto letal, se necesita menor cantidad de cebo para el control de ratas y ratones.

Efecto contundente. Basta una mínima ingestión de ByeRat para provocar la muerte del roedor

- DL50 rata = 1,3 g
- DL50 ratón = 0,2 g

Gran poder de atracción. Formulado con cereales y grasas vegetales de alta palatabilidad

Su formulación en pasta fresca y bloque está especialmente diseñada para su uso en instalaciones ganaderas. Compiten perfectamente con otras fuentes de alimento de las ratas (ej.: pienso) y resisten condiciones de elevada humedad.

Presentación:

- Bolsas de 250 g
(25 bloques/bolsitas de 10 g)
- Caja de 5 kg
(20 bolsas de 250 g)

ByeRat Pasta

Es **la formulación más atractiva y práctica de usar**. Se puede aplicar fuera de los edificios y es de fácil manipulación. Un valor añadido de la pasta es que son visibles los signos de mordiscos. Pueden quitarse fácilmente al final del tratamiento. La formulación, con un alto contenido de grasas, tiene también buenas características de resistencia a la humedad.



ByeRat Bloque

Es **la forma más resistente al agua**. Aunque su palatabilidad es moderada, es la forma con mayor selectividad ante la rata común frente a otros animales. Indicado en zonas con alta humedad o cercanos a cursos de agua.




PLAN DE CONTROL

Medidas de PREVENCIÓN

- Evitar la **acumulación** de escombros y desperdicios.
- Eliminar la proliferación de **vegetación** en el perímetro de las naves y establos.
- Colocar **rejillas** en los agujeros, respiraderos o alcantarillas por los que puedan colarse los roedores.
- Retirar los **restos de alimentos**.
- Evitar la construcción de **falsos techos** o doubles paredes.

ANTES de iniciar el programa

- **Cuantas más granjas** pongan en marcha una campaña de control de roedores al mismo tiempo, **mayor será el éxito**.
- Valorar la presencia de roedores (heces, cables u otros materiales mordisqueados). Si es posible **identificar la especie**.
- **Dibujar un plano** de la granja incluyendo edificios, almacenes, silos, establos, árboles, arbustos, depósitos de material y charcas y cursos de agua. Todos ellos serán considerados puntos de riesgo.
- **Marcar los lugares de riesgo** (silos, canales, escombros, madrigueras...).



COLOCACIÓN de los cebos

- 1 Colocar **ByeRat** (aproximadamente 40 g) en los puntos de riesgo señalados, **a intervalos de 5-10 metros para ratas y de 2 a 3 metros para ratones**.
- 2 Situar los cebos **en un rincón o pegados a una pared**.
- 3 Usar **guantes** para manipular los cebos.
- 4 El cebo debe estar **protegido del agua y de los animales domésticos**. Cubrir con paneles, tubos, tejas o contenedores.
- 5 Anotar la **cantidad y la fecha de colocación** de cebo para llevar un estricto control.

CONTROL de los cebos colocados

- **Controlar los cebos** cada quince días o dos veces por semana en caso de fuerte infestación. Para cada punto de cebo controlar:
 - Si se consume el cebo completamente, **doblar la cantidad** inicial.
 - Si sólo se ha consumido parcialmente, **restituir** la cantidad inicial.
- Reemplazar siempre el cebo que se ha **ensuciado**.
- Mantener el programa de control **durante 6 semanas o hasta que cese** el consumo de **ByeRat**.

