



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)

FICHA TÉCNICA

1. **NOMBRE:** LINCOMICINA SP 400 mg/g Registro nº 1924 ESP

2. **FÓRMULA:**

Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg

Excipiente c.s.p. 1 g

3. **ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:**

Porcino: Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira Hyodysenteriae* sensibles a la Lincomicina.

Aves (Pollos de engorde): Control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la Lincomicina.

4. **POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía oral, a través del agua de bebida.

El agua medicada debe renovarse cada 24 horas.

Porcino: 5 - 10 mg de Lincomicina/Kg de peso vivo y día 24 durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos. Eso corresponde aproximadamente a 30 – 60 mg de Lincomicina por litro de agua de bebida.

Pollos de engorde: 3 - 6 mg de Lincomicina/Kg de peso vivo y día durante 7 días consecutivos. Esto corresponde aproximadamente a 17 mg de Lincomicina por litro de agua de bebida.



5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No administrar en ningún caso a hámsteres, conejos, cobayas, chinchillas, équidos o rumiantes ya que puede causar graves alteraciones gastrointestinales. No utilizar en otras especies de destino distintas a las propuestas.

6. TIEMPO DE ESPERA:

Carne: Porcino: 0 días.

Pollos de engorde: 0 días.

No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

El medicamento veterinario no tiene condiciones especiales de conservación.

8. PRESENTACIÓN:

Envase de 100 g y 1 kg.