

Promotor-L 47 **Avicultura**

Aminoácidos levógiros - Vitaminas hidrosolubles



Aminoácidos

Por litro de producto:

L-Alanina:	7,4 g.	L-Cistina:	4,6 g.	L-Isoleucina:	5,6 g.	L-Prolina:	11,8 g.
L-Arginina:	8,6 g.	L-Ac. Glutámico:	17,8 g.	L-Leucina:	8,7 g.	L-Serina:	12 g.
L-Ac. Aspártico:	10 g.	L-Glicina:	10,3 g.	L-Lisina:	7,6 g.	L-Treonina:	6,2 g.
L-Fenilalanina:	5,8 g.	L-Histidina:	1,5 g.	L-Metionina:	1,8 g.	L-Tirosina:	3,1 g.
L-Valina:	9,3 g.	L-Triptófano:	0,6 g.	Hidroxiprolina:	Trazas		

Vitaminas

Por litro de producto:

Nicotianamida	16,25 g.	Vitamina B ₆	1,125 g.
D-Pantenol	7,5 g.	Inositol	2,5 g.
Vitamina B ₁ HCl	1,75 g.	Biotina	1 mg.
Vitamina B ₂	2,5 g.		

DOSIS y VÍA de ADMINISTRACIÓN:

- Vía oral a través del agua de bebida.
- Primera semana de vida: 1 ml/l, durante 5-7 días.
- En momentos de mayores necesidades (estrés, reacciones postvacunales, restricción alimenticia); 0,5-1 ml/l.
- Otras especies: 2 ml/10 kg de PV/día, durante 4-5 días.

INDICACIONES

- En la recepción de las aves.
- En períodos de estrés.
- En la muda de las gallinas.
- En desequilibrios y deficiencias nutritivas.

EFFECTOS

- Mejora los rendimientos productivos de las aves, ayuda a incrementar el peso y reducir el índice de conversión y mortalidad.
- En gallinas ponedoras y reproductoras: mejora porcentaje de puesta, fertilidad e incubabilidad de los huevos.
- En pollita, aumenta la uniformidad del lote y ayuda a conseguir pesos estándares.



LABORATORIOS CALIER, S.A.

Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 938 495 133
laboratorios@calier.es; www.calier.es

LABORATORIOS CALIER,
MEXICO, S.A. de C.V.

CALIER POLSKA Sp. zo.o,
DE POLONIA

LABORATORIOS CALIER,
DE LOS ANDES, S.A. - COLOMBIA

CALIER PORTUGAL, S.A.
PORTUGAL

CALIER ITALIA, S.A.
ITALIA

LABORATORIOS CALIER,
DE URUGUAY, S.A. - URUGUAY

LABORATORIOS CALIER,
DE VENEZUELA, S.A. - VENEZUELA

LABORATORIOS CALIER
DE ARGENTINA, S.A. - ARGENTINA

LABORATOIRES CALIER,
MAROC, S.A. - MARRUECOS

CALIER Deutschland GmbH
GERMANY





Para que tus resultados fluyan con la
MÁXIMA RENTABILIDAD

Promotor-L 47 **Avicultura**

Aminoácidos levógiros - Vitaminas hidrosolubles




Promotor-L 47 **Avicultura**


Aminoácidos levógiros- Vitaminas hidrosolubles

Aminoácidos de alta digestibilidad

Contiene 19 aminoácidos, esenciales y no esenciales, todos necesarios para el óptimo desarrollo de las aves. Todos los aminoácidos están de forma levógiros, lo que le confiere una alta digestibilidad.



D-Aminoácido



L-Aminoácido

Producto de alta concentración


Las cantidades de cada aminoácido están ajustadas para que, sin llegar a suponer un exceso, sean un suplemento perfecto a la dieta en momentos determinados del ciclo productivo de las aves.

Promotor-L47

Competencia



Producto sin diluir




Diluido a 1 ml/litro

Elevada solubilidad

Formula totalmente soluble con el objetivo de conseguir una mejor aplicación evitándose cualquier problema en los tanques y tuberías de agua. Otros productos con el tiempo precipitan y causan problemas de obstrucción en tuberías.

Concentraciones de Promotor-L 47 (en agua dura)

- 1 Sin diluir
- 2 1 ml/l
- 3 0,5 ml/l




Alta estabilidad

Carece de cualquier componente de fácil degradación, como vitaminas liposolubles, que puedan causar problemas de atascamiento de tuberías o generación de biofilm. La calidad se mantiene íntegra durante más tiempo y no se generan reacciones que alteren la calidad del agua.

Producto competencia

Promotor-L 47 sin capa oleosa



En otros productos se produce una capa oleosa a las 24 horas



Fórmula equilibrada

Se ajusta a las necesidades de las aves siguiendo el concepto de Proteína Ideal. Para que las aves reciban las cantidades necesarias de cada aminoácido, ni más ni menos.



Mejora los rendimientos productivos


REPRODUCTORAS



- Menor Mortalidad
- Mejor Uniformidad
- Mayor Fertilidad
- Mayor Incubabilidad
- Incremento de Nacimientos

Prueba realizada en España. Estirpe Ross 308, 65 semanas.
Protocolo de administración: 1ª semana, 7 días: 1 ml/l. Semanas 4ª, 11ª, 18ª, 25ª y 32ª: 3 días, a 0,5 ml/l. Enero 2012.



POLLO DE ENGORDE



- Índice de Conversión
- Mayor GMD
- Aumento del Peso Final

Prueba realizada en España. Estirpe Cobb. 500. Protocolo de administración: 1ª semana, 7 días: 1 ml/l. Día 15.16.17.18, dos días antes y dos días después de la vacunación de Gumboro. Dosis 0,5 ml/l. Edad de sacrificio; 47 días. Diciembre 2012.



POLLITOS



- Menor Mortalidad
- Mayor Uniformidad
- Mayor GMD
- Aumento del Peso Final

Ensayo realizado con 800 pollitos de 1 día de la línea Hisex White. 2 grupos de 100 aves. 4 repeticiones. Brasil, Septiembre 2012.

PONEDORAS



- Mejor Uniformidad
- Mayor Producción de Huevos
- Menor Mortalidad
- Menor Índice de Conversión

Prueba realizada en Colombia. Estirpe Lohmann LSL. Protocolo de administración: A partir de la semana 18, hasta la 70, cada 4 semanas, dosis 1ml/l de agua de bebida. Abril 2011.